


Roundup Klasik

Kontaktní systemický vodou ředitelný herbicid určený pro hubení nežádoucí buřeně a plevelů v lesních školkách, k přípravě půdy a při ošetření lesních kultur. Jedná se o širokospektrální neselektivní přípravek s účinností proti jednoděložným i dvouděložným plevelům.



➤ Působení přípravku

Herbicid vstupuje do rostlinného těla ošetřených plevelů přes pokožku zelených částí pletiv. Účinná látka je rozváděna v rostlinách jak v jejich nadzemní části, tak do celého kořenového systému. Biochemickým působením v rostlinném těle dochází k postupnému odumírání nežádoucích rostlin.

Přípravek vykazuje herbicidní působení vůči všem běžně se vyskytujícím jednoletým, víceletým i vytrvalým plevelným druhům. Některé plevelné druhy jako např. ostružiník, hasivka orličí, přeslička a některé další vyžadují dávky na horní hranici registrace nebo dělenou aplikaci přípravku.

➤ Dávkování přípravku

Škodlivý činitel	Dávka/ha; koncentrace	Termín a způsob ošetření
lesní školky starší semenáčky starší sje jehličnanů i listnáčů	1 - 3 l 200 l/ha vody	jednoleté i vytrvalé plevele meziřádková aplikace s ochrannými kryty
lesní kultury nálet dřevin a likvidace výmladnosti	2,5 - 15%	aplikace na zelené části nežádoucí buřeně a ošetření řezných ploch
ošetření kultur BO, SM výsadby jehličnanů mimo MD	3 - 5 l 200 l/ha vody	v průběhu veg. období, borovice a smrk po vyžrání tohoročních výhonů nebo s použitím ochranného krytu
BO, SM, listnáče - ošetření přerostlé buřeně	33-50%	knotové hole, smáčecí rámy, jicha nesmí zasáhnout cílovou dřevinu